

粘膜付着型鼻過敏症治療剤

リノコート® パウダースプレー鼻用 25 μ g

使用説明書変更のご案内

このたび、粘膜付着型鼻過敏症治療剤『リノコート® パウダースプレー鼻用 25 μ g』に同梱されており
ます使用説明書を下記のとおり変更いたしますので、ご案内申し上げます。

2021年1月

記

1. 対象品目

リノコート® パウダースプレー鼻用 25 μ g

2. 変更内容

(1) A4版 使用説明書

〈表面〉・タイトルを変更いたしました。

〈裏面〉・タイトルを変更いたしました。

・右下図「残量のめやす」の白い目印を削除いたしました。

変更前

リノコート® パウダースプレー鼻用の噴霧方法
(お使いになる前に裏面の注意事項も必ず読んでください)

1 キャップをはずし、ノズル(白色)の小窓が「噴霧」小窓下の数字が「2」を示していることを確認します。

2 ノズル(白色)を回転させ、小窓下の数字を「2」にします。

3 噴霧器を、平らな所で2~3cmからトントんと2~3回打ちつけます。

4 ノズル(白色)を回転させ、小窓下の数字を「2」にします。

5 片方の鼻筋にノズルを入れ、緑色のポンプ部を、一気に強く2~3回押しします。

6 2~3回の操作を繰り返し、もう片方の鼻筋にも噴霧します。

7 ノズルの先端をきれいに拭き、キャップを閉めて保管袋に入れて保管します。

帝人ファーマ株式会社

変更後

リノコート® パウダースプレー鼻用 を使用されている方へ
お薬の噴霧方法
(お使いになる前に裏面の注意事項も必ず読んでください)

1 キャップをはずし、ノズル(白色)の小窓が「噴霧」小窓下の数字が「2」を示していることを確認します。

2 ノズル(白色)を回転させ、小窓下の数字を「2」にします。

3 噴霧器を、平らな所で2~3cmからトントんと2~3回打ちつけます。

4 ノズル(白色)を回転させ、小窓下の数字を「2」にします。

5 片方の鼻筋にノズルを入れ、緑色のポンプ部を、一気に強く2~3回押しします。

6 2~3回の操作を繰り返し、もう片方の鼻筋にも噴霧します。

7 ノズルの先端をきれいに拭き、キャップを閉めて保管袋に入れて保管します。

帝人ファーマ株式会社

患者の皆様へ お使いになる前に必ずお読みください

噴霧器は分解しないでください。分解すると使えなくなります。

お薬について 改訂部分

- このお薬は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を治すお薬です。
- このお薬は、1日2回、朝と夜に各鼻筋に噴霧します。(医師の指示した用法・用量に従ってください)
- 目や口に噴霧しないでください。
- 噴霧する前に、必ず鼻をかんでください。
- 1回に噴霧するお薬の量はごくわずかです。お薬を噴霧した感じはしますが、説明書と合わせて正しく操作すれば、お薬はきちんと鼻で使われます。
- ノズルを鼻筋の奥まで入れないでください。奥まで入れると鼻水を吸引して使用できなくなることがあります。
- 本包装には、ノズル上部に残量計がついています。噴霧終了後に残量を確認してください。

保管とお手入れについて

- 使用後はノズルの先端をティッシュペーパーできれいに拭き、鼻水がついた場合には、ノズルの中を綿棒あるいはティッシュペーパーをよりこよりにして拭き取ってください。
- アルミ包装開封後は、保管袋に入れて高温・多湿を避けて保管してください。
- アルミ包装開封後、長期経過したものは使用しないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 噴霧器を水洗いしないでください。

廃棄方法について

- 噴霧器はプラスチック製です。お薬がなくなりましたら、プラスチックごみとして各自自治体の指示にしたがって廃棄してください。

残量計の見かた

- 残量のめやすを3色で表示しています。(お薬を使用することによって黄→赤→白と変わっていきます)
- 黄色 …… 十分お薬が残っています
- 赤色 …… もう少しお薬がなくなっています
- 白色 …… 新しいお薬を用意してください

残量のめやす
(1日2回、各鼻筋に噴霧した場合)

使用開始日 (黄)	残り5日 (黄)	残り3日 (赤)	残り1日 (白)	終了
60	20	10	0	0

改訂部分

お使いになる前に必ずお読みください

噴霧器は分解しないでください。分解すると使えなくなります。

お薬について 改訂部分

- このお薬は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を治すお薬です。
- このお薬は、1日2回、朝と夜に各鼻筋に噴霧します。(医師の指示した用法・用量に従ってください)
- 目や口に噴霧しないでください。
- 噴霧する前に、必ず鼻をかんでください。
- 1回に噴霧するお薬の量はごくわずかです。お薬を噴霧した感じはしますが、説明書と合わせて正しく操作すれば、お薬はきちんと鼻で使われます。
- ノズルを鼻筋の奥まで入れないでください。奥まで入れると鼻水を吸引して使用できなくなることがあります。
- 本包装には、ノズル上部に残量計がついています。噴霧終了後に残量を確認してください。

保管とお手入れについて

- 使用後はノズルの先端をティッシュペーパーできれいに拭き、鼻水がついた場合には、ノズルの中を綿棒あるいはティッシュペーパーをよりこよりにして拭き取ってください。
- アルミ包装開封後は、保管袋に入れて高温・多湿を避けて保管してください。
- アルミ包装開封後、長期経過したものは使用しないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 噴霧器を水洗いしないでください。

廃棄方法について

- 噴霧器はプラスチック製です。お薬がなくなりましたら、プラスチックごみとして各自自治体の指示にしたがって廃棄してください。

残量計の見かた

- 残量のめやすを3色で表示しています。(お薬を使用することによって黄→赤→白と変わっていきます)
- 黄色 …… 十分お薬が残っています
- 赤色 …… もう少しお薬がなくなっています
- 白色 …… 新しいお薬を用意してください

残量のめやす
(1日2回、各鼻筋に噴霧した場合)

使用開始日 (黄)	残り5日 (黄)	残り3日 (赤)	残り1日 (白)	終了
60	20	10	0	0

改訂部分

→裏面に続く

(2) B6版 使用説明書

- 〈表面〉
- ・タイトルを変更いたしました。
 - ・ページ下の裏面への案内文を変更いたしました。
 - ・ページ下に会社名を追記いたしました。
- 〈裏面〉
- ・タイトルを変更いたしました。
 - ・ページ下の裏面への案内文を変更いたしました。

変更前	変更後
リノコート® パウダースプレー鼻用の正しい使い方 1 噴霧前に必ず鼻をかんでください 改訂部分 2 ノズルを回転させ、両鼻腔に噴霧します 3 両鼻腔の噴霧が終了したら、ノズル部を清掃してください 改訂部分 * ノズルについた鼻水をそのまま拭き取ります。使用できなくなることがあります。 裏面の「お手入れ方法について」も必ずお読みください	リノコート® パウダースプレー鼻用 を使用されている方へお薬の噴霧方法 1 噴霧前に必ず鼻をかんでください 改訂部分 2 ノズルを回転させ、両鼻腔に噴霧します 3 両鼻腔の噴霧が終了したら、ノズル部を清掃してください 改訂部分 * ノズルについた鼻水をそのまま拭き取ります。使用できなくなることがあります。 裏面の「お手入れ方法」も必ずお読みください TEIJIN 帝人ファーマ株式会社
リノコート® パウダースプレー鼻用 お手入れ方法について 下記のお手入れ方法 改訂部分 使用ください。 ・噴霧後は、ノズルの先端をティッシュペーパーなどできれいに拭いてください。 ・鼻水がついた場合には、噴霧後、綿棒あるいはティッシュペーパーをこより状にねじって、ノズルの中を拭いてください。 綿棒を用いる場合 ティッシュペーパーを用いる場合 改訂部分 裏面の「正しい使い方」も必ずお読みください	リノコート® パウダースプレー鼻用 を使用されている方へお手入れ方法 下記のお手入れ方法 改訂部分 使用ください。 ・噴霧後は、ノズルの先端をティッシュペーパーなどできれいに拭いてください。 ・鼻水がついた場合には、噴霧後、綿棒あるいはティッシュペーパーをこより状にねじって、ノズルの中を拭いてください。 綿棒を用いる場合 ティッシュペーパーを用いる場合 改訂部分 裏面の「お薬の噴霧方法」も必ずお読みください

3. 変更開始製造番号および出荷予定時期

製品名	包装単位	変更開始製造番号※	出荷予定時期※※
リノコート® パウダースプレー鼻用 25 μ g	10本	4512	2021年2月

※個装箱への「変更品」の表示はいたしませんので、ご了承下さい。

※※出荷予定時期は弊社配送センターより特約店に出荷される時期です。弊社在庫状況により、出荷予定時期に若干の差異が生じることがございますので、予めご了承ください。

以上